

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 21-12-82085695

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

1er Avril 1982

PUBLICATION PERIODIQUE

EDITION DE LA STATION PROVENCE - ALPES - COTE D'AZUR et CORSE

(ALPES de HAUTE PROVENCE, HAUTES-ALPES, ALPES MARITIMES, BOUCHES-DU-RHONE, HAUTE-CORSE, CORSE SUD, VAR, VAUCLUSE, SUD de la DROME)

SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX

Siège de la circonscription : 24, Rue Edouard Delanglade - 13006 MARSEILLE

Station d'Alertes : Quartier Cantarel - MONTFAVET Adresse Postale : B.P. 95 84140 MONTFAVET - TELEPHONE : (90) 88.21.83
ABONNEMENT ANNUEL : F REGISSEUR DE RECETTES DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'AGRICULTURE AVIGNON CCP MARSEILLE 9660 74 V

SPECIAL GRANDES CULTURES

CEREALES

ROUILLE BRUNE

En Camargue et Crau la présence du champignon est observée sur blé dur et blé tendre .Ce champignon se présente sous la forme de petites pustules brun orangé, éparses sur le limbe des feuilles .

Le seuil d'intervention qui est de 5 % de la surface foliaire occupée est prêt d'être atteint dans un grand nombre de situations de Camargue et Crau .

En conséquence, il est recommandé de surveiller les parcelles en question et d'intervenir si ce seuil est observé .

En 1981, les attaques avaient été brutales près de la floraison rendant difficile tout rattrapage .Afin d'éviter une telle situation, il conviendrait d'intervenir au cours de la montaison .

Les spécialités les plus efficaces sur Rouille brune sont Vigil, Tilt, Corbel, Bayleton .

Vigil et Tilt ont rattrapé en 1981 des situations difficiles .

Les 4 spécialités sont efficaces sur Oïdium, mais ce champignon ne pose des problèmes que lorsqu'il atteint les 3 dernières feuilles avant épi .

Les matières actives de base de ces quatre spécialités sont associées à d'autres matières actives qui augmentent le nombre de maladies combattues .Aussi, en intervenant au stade 2 noeuds on peut atteindre les maladies du pied avec Bayleton total, Bayleton triple, Tilt C, Vigil K, maladie dont l'incidence paraît notable sur le rendement dans notre région .

Bayleton triple, Tilt C, Vigil T combattent la Septoriose non encore présente .

LUZERNE

PHYTONOME -

Dans les zones précoces des Bouches-du-Rhône et de la vallée du Rhône on observe actuellement la présence de larves dans les bourgeons .

Il est recommandé d'intervenir immédiatement avec phosalone 60 g MA/hl (Zolone) ou toxaphène 225 g MA/hl (Phénoryl) .

Ailleurs, n'intervenir que si l'observation des bourgeons est positive .

LE CHEF DE LA CIRCONSCRIPTION PHYTOSANITAIRE
PROVENCE-ALPES-COTE d'AZUR & CORSE

P. DUFFAUD